

1

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

14.07.2025

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата
Глистогон Плюс суспензия (Glistogon Plus suspensio)

(организация-разработчик АО «НПФ «Экопром»; 140070, Московская обл.,
г. Люберцы, р. п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263)

Номер регистрационного удостоверения: 32-3-6.21-4748 № ПВР-3-6.15/03171

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование - Глистогон Плюс суспензия;
международные непатентованные наименования действующих
веществ: пирантел, празиквантел.

2. Лекарственная форма: суспензия для приема внутрь.

Глистогон Плюс суспензия в 1 мл в качестве действующих веществ
содержит пирантела памоат – 250 мг, празиквантел – 50 мг и
вспомогательные вещества: твин-80, глицерин, сорбат калия, бензоат натрия,
циклодекстрин, неотам и воду питьевую.

3. Препарат представляет собой суспензию от серо-желтого до желтого
цвета. При хранении допускается расслоение суспензии, исчезающее при
взбалтывании.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в
закрытой упаковке производителя – 3 года со дня производства, после
вскрытия флакона - не более 6 месяцев.

Не применять по истечении срока годности.

4. Выпускают Глистогон Плюс суспензию расфасованной по 7 мл в
стеклянные флаконы соответствующей вместимости с навинчиваемыми
крышками, которые упакованы поштучно в картонные пачки вместе с
инструкцией по применению и полимерным шприцом-дозатором объемом 3
мл.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном
от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и
кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С.

6. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

1

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Глистогон Плюс суспензия относится к фармакотерапевтической группе антигельминтные средства в комбинациях.

10. Празиквантел и пирантела памоата, входящие в состав препарата, обеспечивают широкий спектр его антигельминтного действия на круглых и ленточных гельминтов, паразитирующих в желудочно-кишечном тракте у собак, в том числе *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Ancylostoma caninum*, *Echinococcus granulosus*, *Alveococcus multilocularis*, *Mesocostoides lineatus*, *Dipylidium caninum*, *Diphyllobotrium latum*, *Multiceps multiceps*.

Пирантел памоат – соединение группы пиримидинов, активно в отношении половозрелых и неполовозрелых нематод, механизм его действия основан на блокаде передачи нервных импульсов в нервно-мышечных синапсах путем деполяризации мембран мышечных клеток, что вызывает паралич мышечной системы нематод; пирантел плохо всасывается, что обеспечивает его пролонгированное действие на гельминтов в кишечнике; выводится из организма в основном в неизмененном виде (93%) с фекалиями.

Празиквантел – соединение группы пиразинизохинолинов, активно в отношении половозрелых и неполовозрелых цестод; механизм его действия основан на индуцировании распада тегумента и ингибировании фумаратредуктазы, стойкой деполяризации мышечных клеток гельминта, нарушении энергетического обмена, что вызывает паралич и гибель цестод и способствует их выведению из желудочно-кишечного тракта. Празиквантел быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте, достигая максимальной концентрации в плазме крови через 1 - 3 часа, распределяется в органах и тканях животного; связывается с сывороточными белками крови (70 - 80%), частично метаболизируется в печени, реэкскретируется в кишечник, выводится из организма в основном с мочой (до 80%) в течение 24 часов.

Глистогон Плюс суспензия по степени воздействия на организм относится к «веществам малоопасным» (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76); в рекомендуемых дозах не оказывает иммунотоксического, эмбриотоксического и тератогенного действия. Хорошо переносится собаками разных пород и возрастов.

III. Порядок применения

11. Глистогон Плюс суспензию назначают взрослым собакам, а также щенкам с 4-недельного возраста с лечебной и профилактической целью при нематодозах (токсокароз, токсаскаридоз, унцинариоз, анкилостомоз, трихоцефалез), цестодозах (тениидозы, дипилидиоз, эхинококкоз, дифиллоботриоз, мезоцестидоз) и ассоциативных нематодо-цестодозных инвазиях.

12. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата, в том числе в анамнезе. Не следует применять препарат истощенным, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным.

13. При работе с Глистогон Плюс суспензией следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Глистогон Плюс суспензией. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата и этикетку).

Пустые флаконы из-под лекарственного препарата и шприцы-дозаторы запрещается использовать для бытовых целей, их помещают в полиэтиленовый пакет и утилизируют с бытовыми отходами.

14. Не следует применять препарат самкам в последнюю треть беременности и в период вскармливания приплода, а также щенкам моложе 4-недельного возраста.

15. Препарат применяют перорально индивидуально, однократно в утреннее кормление с небольшим количеством корма или вводят принудительно на корень языка с помощью шприца-дозатора в дозе 1 мл на 10 кг массы животного. Перед каждым применением флакон с суспензией следует тщательно встряхнуть.

С лечебной целью дегельминтизацию животных проводят по показаниям. При сильной степени инвазии обработку рекомендуется повторить через 10 - 14 дней.

С профилактической целью дегельминтизацию животных проводят в терапевтической дозе один раз в 3 месяца, а также за 10 - 14 дней перед каждой вакцинацией.

16. Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. У некоторых животных возможны нарушения работы желудочно-кишечного тракта и усиление слюноотделения, которые исчезают самопроизвольно и не требуют применения лекарственных средств.

При повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата и появлении аллергических реакций его использование прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. При передозировке препарата у животного может наблюдаться угнетенное состояние, отказ от корма, избыточное слюноотделение, расстройство желудочно-кишечного тракта. В этих случаях животному назначают энтеросорбенты и средства симптоматической терапии.

18. Не следует применять препарат одновременно с антигельминтными средствами, содержащими пиперазин, и препаратами, ингибирующими холинэстеразу.

19. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. При проведении дегельминтизации следует придерживаться рекомендуемых инструкцией сроков. В случае пропуска очередной обработки применение препарата возобновляют в той же дозе по той же схеме.

21. Препарат Глистогон Плюс суспензия не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата

АО «Научно-производственная
фирма «Экопром»; Московская
обл., г. Люберцы, р. п. Томилино,
ул. Гаршина, д. 11/33.

Наименование и адрес организации,
уполномоченной владельцем
регистрационного удостоверения
лекарственного препарата на
принятие претензий от потребителя

АО «Научно-производственная
фирма «Экопром»; Московская
обл., г. Люберцы, р. п. Томилино,
ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263.

Генеральный директор
АО «НПФ «Экопром»



В.В. Тарабрин