

0 5.11. 2025

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Неотерика Протекто ошейник (Neoterica Protecto collar)

(Организация-разработчик: Neoterica GmbH, Grillostr. 18, 45141, Essen, Germany / Неотерика ГмбХ, Грилло штр. 18, 45141, Эссен, Германия)

Номер регистрационного удостоверения: 276-3-10.19-4506№ПВР-3-10.19/03482

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Неотерика Протекто ошейник.

Международные непатентованные наименования действующих веществ: имидаклоприд, этофенпрокс, пирипроксифен.

2. Лекарственная форма: полимерная лента.

Препарат Неотерика Протекто ошейник содержит в качестве действующих веществ: имидаклоприд – 10,0%, этофенпрокс – 5,0%, пирипроксифен – 0,44% и вспомогательные компоненты: ПВХ-С-70-59-М, ди-(2-этилгексил)-фталат (ДОФ), масло эпоксицированное соевое, концентрат жидкий «БАСКО» для окрашивания ПВХ (серебристый перламутр), метил олова меркаптит, эфирное масло герани египетской.

3. Препарат представляет собой влагостойкую полимерную ленту серебристого цвета с фиксатором.

Срок годности ошейника при соблюдении условий хранения – 5 лет со дня производства. Не применять по истечении срока годности.

4. Выпускают ошейник длиной: 65 см и 75 см (для средних и крупных собак), 40 см (для кошек и мелких собак) в индивидуальных герметично закрытых полиэтиленовых пакетах, помещенных по 2 штуки в банки металлические со съемными крышками вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят ошейник в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °С до 30 °С.

6. Ошейник следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный Неотерика Протекто ошейник утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Неотерика Протекто ошейник относится к комбинированным инсектоакарицидным лекарственным препаратам.

10. Имидаклоприд, этофенпрокс и пирипроксифен, входящие в состав препарата, обеспечивают широкий спектр его контактного инсектоакарицидного действия на половозрелые и неполовозрелые (личинки) фазы развития блох (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*), вшей (*Linognathus setotus*), власоедов (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*) и иксодовых клещей (*Ixodidae*), паразитирующих на кошках и собаках, а также защиту животных в течение 5 суток от кровососущих двукрылых насекомых (комаров, мошек и москитов).

Имидаклоприд относится к группе хлороникотиниловых инсектицидов, механизм действия которых основан на взаимодействии с ацетилхолиновыми рецепторами членистоногих и нарушении передачи нервных импульсов, что приводит к гибели насекомых.

Этофенпрокс обладает инсектоакарицидной и репеллентной активностью, оказывает нокдаун-эффект при первом контакте насекомых и иксодовых клещей с шерстью обработанного животного (до укуса или прикрепления). Его действие обусловлено блокированием проведения нервного импульса у эктопаразита за счет изменения проницаемости мембран, что приводит к парализующему эффекту.

Пирипроксифен — аналог природного ювенильного гормона, регулирующего рост и развитие насекомых. Механизм его действия заключается в нарушении процессов синтеза хитина и линьки личинок, что препятствует развитию полноценных куколок, вызывая гибель на преимагинальных фазах развития, прекращает появление половозрелых насекомых на животных и в местах их содержания.

Постепенно выделяясь с поверхности ленты, действующие вещества, не всасываясь в системный кровоток, переносятся на кожно-волосистой покров животного, накапливаясь в эпидермисе, волосистых луковицах и сальных железах животного и оказывают длительное инсектоакарицидное и репеллентное действие.

Неотерика Протекто ошейник по степени воздействия на организм при пероральном применении относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), при однократном нанесении на кожу — к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не оказывает местно-раздражающего, резорбтивно-токсического, эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного и sensibilizing действия, токсичен для пчел, рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

11. Неотерика Протекто ошейник применяют кошкам и собакам для лечения и профилактики арахноэнтомозов, вызываемых блохами, вшами, власоедами, иксодовыми клещами, а также для защиты животных в течение 5

суток от нападения двукрылых кровососущих насекомых и профилактики трансмиссивных заболеваний (бабезиоз, боррелиоз, дирофиляриоз).

12. Противопоказанием к применению Неотерика Протекто ошейник является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Не следует применять препарат больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным.

13. При работе с Неотерика Протекто ошейник следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Животное с Неотерика Протекто ошейник не следует подпускать к маленьким детям, беременным и кормящим женщинам. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Неотерика Протекто ошейник. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании компонентов ошейника в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

14. Применение ошейника беременным и кормящим животным возможно после консультации с ветеринарным врачом. Не следует применять препарат щенкам и котятм моложе 3-месячного возраста.

15. После вскрытия упаковки ошейник разворачивают и надевают на животное, подгоняя по размеру так, чтобы между шеей животного и ошейником оставался промежуток в 1,0 - 1,5 см, затем закрепляют фиксатором и излишек ленты срезают.

Гибель паразитирующих на животном эктопаразитов происходит до 24 часов после применения ошейника.

Непрерывное использование ошейника обеспечивает защиту животных от блох, вшей, власоедов и иксодовых клещей до 6 месяцев, от кровососущих двукрылых насекомых – до 5 дней.

Животных с грязной и спутанной шерстью перед применением Неотерика Протекто ошейник рекомендуется тщательно вымыть с моющим средством, а при сильной степени поражения насекомыми – с инсектицидным шампунем.

Перед купанием или мытьем животного ошейник рекомендуется снимать и вновь надевать, после того, как шерсть животного полностью высохнет.

В целях предотвращения повторной инфекации блохами животным заменяют подстилки или обрабатывают их инсектицидным препаратом в соответствии с инструкцией по применению.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Неотерика Протекто ошейник в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В редких случаях возможны индивидуальные реакции кожи (покраснение, зуд), которые самопроизвольно проходят и не требуют применения лекарственных средств.

При случайном попадании частей ошейника внутрь у животного возможны симптомы интоксикации (рвота, расстройство пищеварения, саливация), в этом случае рекомендуется применение средств симптоматической терапии.

В случае проявления аллергических реакций у чувствительного к компонентам препарата животного, ошейник снимают, животное тщательно моют с моющим средством и при необходимости назначают антигистаминные и симптоматические средства.

17. При передозировке препарата у некоторых животных могут наблюдаться угнетенное состояние, слюнотечение, рвота. В этом случае ошейник следует снять и назначить животному средства симптоматической терапии.

18. Неотерика Протекто ошейник не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными препаратами для обработки животных.

19. Особенности действия лекарственного препарата при первом применении или отмене не выявлено.

20. Неотерика Протекто ошейник используют непрерывно в течение сезона активности паразитов. Следует избегать нарушений режима применения ошейника, так как это может привести к снижению эффективности.

21. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения	АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г.о. Люберцы, пгт. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23.
--	--

Наименование и адрес организации, уполномоченной владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя	АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г.о. Люберцы, пгт. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263.
---	---

Генеральный директор
Neoterica GmbH

NEOTERICA GmbH
Grillostrasse 18 45141
Essen, Deutschland

С.Р. Бах